



MATERIA: FARMACOLOGÍA Y TERAPÉUTICA II

DOCENTE: DRA. JUDITH BUCETT SANTA CRUZ.

GRUPO: "G"

INTEGRANTES:

NATALIA ZURITA VACA 54987.

XIMENA ZURITA VACA 35275.

LUANA ORTIZ MERUBIA 55074.

JUAN MANUEL SORIDCO PARAPAINO 41901.

PAUL CRISHTOFER VILLAR PORRAS 36694.

DARLING MAYTE GUTIEEREZ VERA 47055.

JHONNATAN BOBARIN CASTILLO 46034.

ELDDY JHULIANNE VARGAS 50170.

GARY SALAZAR ALBA 50003.

JESSE JENNINGS MARINHO 58610.

NAILA ALEYDA CHAVARRIA 59232.

FECHA Y AÑO: 05/12/2021

FARMACOLOGÍA DEL METRONIDAZOL COMO ANTIBIÓTICO.

¿Para cuáles condiciones o enfermedades se prescribe este medicamento?

Las tabletas y las cápsulas de metronidazol se utilizan para tratar infecciones del sistema reproductor, tracto gastrointestinal (GI), piel, corazón, huesos, articulaciones, sangre, sistema nervioso y otras áreas del cuerpo. Las tabletas y las cápsulas de metronidazol también se utilizan para tratar enfermedades de transmisión sexual (ETS). Las tabletas de liberación prolongada (acción prolongada) de metronidazol se utilizan para tratar la vaginosis bacteriana (una infección ocasionada por determinado tipo de bacterias dañinas en la vagina) en las mujeres. El metronidazol pertenece a una clase de medicamentos llamados antimicrobianos. Su acción consiste en detener el crecimiento de la bacteria.

Los antibióticos no funcionarán para resfriados, catarro u otras infecciones virales. Usar antibióticos cuando no son necesarios aumenta el riesgo de contraer una infección que se resista al tratamiento con antibióticos más adelante.

¿Cómo se debe usar este medicamento?

La presentación del metronidazol es en tableta, una tableta de liberación prolongada y como una cápsula para tomar por vía oral. Las tabletas y cápsulas de metronidazol por lo general se toman como una dosis única (o dividida en dos dosis en 1 día) o dos para tomar cuatro veces al día hasta por 10 días o más. Las tabletas de liberación prolongada de metronidazol usualmente se toman una vez al día al menos 1 hora antes o 2 horas después de una comida durante 7 días. Siga atentamente las instrucciones que se encuentran en la etiqueta de la receta médica y pida al médico o farmacéutico que le explique cualquier parte que no comprenda. Tome metronidazol exactamente como se le indica. No tome una cantidad mayor ni menor del medicamento, ni lo tome con más frecuencia de la que el médico le indique.

¿Qué otro uso se le da a este medicamento?

Las tabletas de metronidazol se utilizan para tratar la vaginosis bacteriana en las mujeres.

Este medicamento se puede recetar para otros usos; para obtener más información hable con su médico o farmacéutico.

¿Qué tengo que hacer si me olvido de tomar una dosis?

Tome la dosis que omitió tan pronto como la recuerde. Sin embargo, si ya casi es hora de la próxima dosis, omita la que olvidó y continúe con su programa normal de dosificación. No duplique la dosis para compensar la dosis omitida.

¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento?

El metronidazol puede ocasionar efectos secundarios. Informe al médico si cualquiera de estos síntomas es intenso o no desaparece:

- vómitos,
- náuseas,
- diarrea,
- estreñimiento,
- molestias estomacales,
- calambres estomacales,
- pérdida de apetito,
- dolor de cabeza,
- boca seca,
- sabor metálico desagradable, ácido,
- lengua vellosa; irritación en la lengua o en la boca.

Algunos efectos secundarios pueden ser graves:

- entumecimiento, dolor, ardor u hormigueo en las manos o pies,
- convulsiones,
- sarpullido,
- picazón,
- urticaria,
- descamación de la piel o piel con ampollas,
- rubor,
- nariz congestionada, fiebre, dolor de garganta u otros síntomas de infección,
- dolor de articulaciones,
- mareos,
- dificultad para hablar,
- problemas con la coordinación,

- confusión,
- agitación.

El metronidazol puede ocasionar otros efectos secundarios. Llame a su médico si tiene algún problema inusual mientras toma este medicamento.

Los síntomas de una sobredosis pueden incluir los siguientes:

- náuseas,
- vómitos,
- pérdida de la coordinación muscular,
- entumecimiento, dolor, ardor u hormigueo en las manos o pies,
- convulsiones.

¿Qué otra información de importancia debería saber?

Asista a todas las citas con su médico y a las del laboratorio. Su médico ordenará algunas pruebas de laboratorio para comprobar su respuesta al metronidazol.

Antes de realizarse alguna prueba de laboratorio, informe al médico y al personal del laboratorio que está tomando metronidazol.

No deje que nadie más use su medicamento. Es probable que no pueda volver a surtir su receta médica. Si aún tiene síntomas de infección después de terminar el metronidazol, llame a su médico.

Es importante que Usted mantenga una lista escrita de todas las medicinas que Usted está tomando, incluyendo las que recibió con receta médica y las que usted compró sin receta, incluyendo vitaminas y suplementos de dieta. Usted debe tener la lista cada vez que visita su médico o cuando es admitido a un hospital. También es una información importante en casos de emergencia.